



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«07» 05.2020

№ 302-р

О внесении изменений  
в распоряжение  
Комитета по здравоохранению  
от 16.04.2020 № 229-р

Внести в распоряжение Комитета по здравоохранению от 16.04.2020 № 229-р «Об организации оказания медицинской помощи на дому в условиях эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1. Пункт 1.4 распоряжения исключить.
2. Дополнить распоряжение пунктом 3-1 следующего содержания:  
«3-1. Рекомендовать схему лечения легких форм ОРВИ с подозрением на COVID-19 согласно приложению к настоящему распоряжению».
3. В приложение № 1 к распоряжению раздел «Показания к госпитализации» дополнить абзацем следующего содержания:

«Госпитализация после проведения пациентам старше 18 лет амбулаторного РКТ осуществляется:

- при КТ 1\* - направляется на лечение на дому; с учетом клинической симптоматики и при невозможности организации лечения на дому – в инфекционное отделение по адресу: Большой проспект Васильевского острова, д. 103, лит. К, Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн»;

- при КТ 2-4 - через Центр экстренной медицинской эвакуации в медицинские организации, осуществляющие оказание специализированной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и внебольничными пневмониями.

\*«Эмпирическая» визуальная шкала оценки примерного объема уплотненной легочной ткани в обоих легких:

1. Отсутствие характерных проявлений (КТ-0)
2. Минимальный объем/распространенность < 25% объема легких (КТ-1)
3. Средний объем/ распространенность 25-50% объема легких (КТ-2)
4. Значительный объем/ распространенность 50-75% объема легких (КТ-3)
5. Критический объем/ распространенность свыше 75% % объема легких (КТ-4)»

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по здравоохранению Антипова Е.Ю.

Председатель Комитета  
по здравоохранению



Д.Г. Лисовец

**Рекомендуемые схемы лечения легких форм ОРВИ с подозрением на COVID-2019**  
(учитывая отсутствие объективных доказательств эффективности применения указанных препаратов при COVID-2019, назначение лечения должно обязательно сопровождаться получением добровольного информированного согласия пациента (или его законного представителя))

1. **Рекомбинантный интерферон альфа.** Капли или спрей в каждый носовой ход 5-6 раз в день (разовая доза 3000 МЕ, суточная доза – 15000-18000 МЕ) + **гидроксихлорохин** 600 мг в первый день (3 раза по 200 мг), 400 мг во второй день (2 раза по 200 мг), далее по 200 мг в сутки в течение 5 дней;
2. **Умифеновир:** 200 мг 4 раза в сутки + **гидроксихлорохин** 600 мг в первый день (3 раза по 200 мг), 400 мг во второй день (2 раза по 200 мг), далее по 200 мг в сутки в течение 5 дней;
3. **Рекомбинантный интерферон альфа.** Капли или спрей в каждый носовой ход 5-6 раз в день (разовая доза 3000 МЕ, суточная доза – 15000-18000 МЕ) + **мефлохин** 500 мг в первый и второй день (2 раза по 250 мг), далее по 250 мг в сутки в течение 5 дней (при недоступности гидроксихлорохина);
4. **Умифеновир:** 200 мг 4 раза в сутки + **мефлохин** 500 мг в первый и второй день (2 раза по 250 мг), далее по 250 мг в сутки в течение 5 дней (при недоступности гидроксихлорохина);
5. **Рекомбинантный интерферон альфа.** Капли или спрей в каждый носовой ход 5-6 раз в день (разовая доза 3000 МЕ, суточная доза – 15000-18000 МЕ) + **умифеновир**, 200 мг 4 раза в сутки – в течение 5 дней (при наличии противопоказаний к назначению гидроксихлорохина и мефлохина).

**Для детей в соответствии с инструкцией к препаратам.**